SANGROVIT® Water Soluble

Научные исследования по здоровью
органов пищеварения



ХВАТИТ СТРАДАТЬ

СТРЕСС ПРОВОЦИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Стресс-факторы вызывают множество заболеваний и сопутствующих симптомов, например, воспаление кишечника.



Как результат - лихорадка и снижение аппетита, сопровождаемые снижением продуктивности и созданием более благоприятной окружающей среды для патогенных организмов. Необходимые питательные вещества потеряны. Иммунная система перегружена, что ведет к увеличенной потребности защитных функций в аминокислотах. Применяются антибиотики. Потребляется меньшее количество ценного корма, и он остается недоступным для продуктивности и роста. В результате продолжительного стресса наблюдается дегенерация мышц вместо их роста.
Для снижения количества используемых антибиотиков, они должны быть тщательно подобраны под конкретное заболевание. Для поддержания здоровья животных и профилактики дальнейших воспалительных процессов необходимо использовать комбинацию активных веществ.

РЕШЕНИЕ: SANGROVIT® Water Soluble

Sangrovit® WS – кормовая добавка, состоящая из органических кислот и специальных активных компонентов из растительного экстракта, таких как изохинолиновые алкалоиды. Алкалоиды подготавливаются и становятся доступными благодаря специальному запатентованному процессу производства

Эффективность Sangrovit® WS доказана огромным количеством широкомасштабных исследований в ведущих научно-исследовательских центрах. Sangrovit® WS функционально воздействует на аппетит, состояние и здоровье животных.
Sangrovit® WS очень гибок в применении и при необходимости может быть незамедлительно использован через питьевую воду, например, в качестве альтернативы антибиотикам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ПРОФИЛАКТИКА С SANGROVIT® Water Soluble

Sangrovit® WS стимулирует потребление корма даже во время болезни, обеспечивая животное питательными веществами для активной защиты организма. Научные исследования доказали, что Sangrovit® WS увеличивает потребление корма и адсорбцию аминокислот. Таким образом, он оказывает положительное влияние на здоровье кишечника и животного в целом.

- Повышение потребления корма
- Здоровый кишечник
- Защита кишечника от кровоизлияний
- Оптимизация усвоения питательных веществ
- Предотвращение гипервоспаления



SANGROVIT® Water Soluble

Sangrovit® WS за работой: воздействие продукта на воспаление стенки кишечника, вызванное патогенами, токсинами и другими антигенами.

SANGROVIT® Water Soluble

Влияние Sangrovit® WS на сальмонеллу: улучшает адсорбцию аминокислот и снижает количество медиаторов воспаления. Результат: здоровая слизистая оболочка ЖКТ.

КОГДА ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ SANGROVIT® WS

- Во время конечной фазы роста, исключающей возможность применения антибиотиков
- Для улучшения эффективности кормления и стимуляции потребления корма
- Для улучшения работы программ вакцинации и препаратов
- В периоды стресса и в качестве профилактики заболеваний
- В качестве лечения хронического воспаления ЖКТ, вызванного, например, сальмонеллой или клостридией

ИДЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® Water Soluble

Sangrovit® WS стимулирует усвоение питательных веществ, необходимых для здоровья и продуктивности животного, тем самым поддерживая здоровье кишечника.

ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® WS НА АДСОРБЦИЮ АМИНОКИСЛОТ

Опыт был презентован на научной конференции BOKU, Австрия, Вена, 2010

Бройлеры, отбор образцов крови,
38 дней, Росс 309,
Кормление в соответствии с рекомендациями
КИП (Комитет по исследованию питания)
Кукурузно-соевый рацион

Результат: снижение кормовых издержек, улучшение здоровья и качества тушки.



ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® WS НА САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

Сальмонеллы в слепой кишке (профессор E. Santin, Федеральный университет Параны, Бразилия, 2009). В возрасте 14 дней птица была инфицирована бактериями Salmonella enteritidis (150 КОЕ/мл). С 15 дня жизни в течение 7 дней одной группе выпаивался Sangrovit® WS в дозировке 100 мг/л.

7 дней после инфицирования бактериями Salmonella enteritidis (SE):

Контрольная группа 15% свободны от SE



SANGROVIT® Water Soluble
100% свободны от SE

Результат: по истечении 7 дней применение Sangrovit® WS привело к снижению количества бактерий сальмонеллы ниже предела обнаружения.

ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® WS НА КЛОСТРИДИОЗ

Подсчет повреждений в опыте с инфицированием
(профессор M. Quereshi, Государственный университет Северной Каролины, США, 2004)
Лабораторное исследование, бройлеры в возрасте 14 дней были инфицированы патогенным штаммом клостридии (10^8 КОЕ)

Повреждения слизистой оболочки кишечника сигнализируют о некротических изменениях (некротический энтерит)
0 – 1 = повреждения отсутствуют, кишечник здоров
2 – 3 = видимые повреждения кишечника
4 – 5 = кровавая диарея, смерть

Результат: спустя 7 дней после инфицирования был использован Sangrovit® WS, выявлено снижение повреждений кишечника, вызванных clostridium perfringens, на 80 %.

7 дней после инфицирования

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НА РАДОСТЬ ВЕТЕРИНАРАМ, ФЕРМЕРАМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ

SANGROVIT® Water Soluble

Предоставляет возможность получить большую выгоду при значительном снижении количества применяемых антибиотиков. Высокая продуктивность при лучшем усвоении питательных веществ.

- **Визуально более здоровые животные**
- **Сокращение периода выздоровления**
- **Снижение кормовых издержек**
- **Улучшение качества тушки**
- **Повышение яйценоскости**
- **Отсутствие периода ожидания**



SANGROVIT® Water Soluble МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

НАША IQ INSIDE ГАРАНТИЯ

НАШ ПРИНЦИП: УМНОЕ КАЧЕСТВО ВНУТРИ

Мы работаем в соответствии с нашим принципом - «знания внутри».
Наша высококвалифицированная международная команда производит для Вас «умные» и проработанные продукты, повышающие Вашу прибыль.

Если Вы хотите узнать больше о Sangrovit® WS и принципе IQ INSIDE, просим Вас связаться с нами, и мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

IQ® INSIDE

ДОЗИРОВКИ

SANGROVIT® Water Soluble ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	Г/1000Л ВОДЫ
БРОЙЛЕРЫ:		
Старт	5 - 7 дней	50
Рост	5 - 7 дней	100
Финиш	5 - 10 дней	50
НЕСУШКИ:	Применять по необходимости (влажный помет, бледный желток, бледный гребешок)	
Молодка	7 дней по необходимости	100
Начало яйцекладки	2 недели в качестве стимулятора яйценоскости	100
Яйцекладка	5 дней по необходимости или каждый квартал	100
ИНДЮШКИ:		
Старт	5 – 7 дней при мокром помете	100
Рост	5 – 7 дней при мокром помете	100
Финиш	5 – 7 дней при мокром помете в течение 3 дней до забоя	50 100
ГУСИ И УТКИ:	В качестве поддержки при транспортировке и заселении	
При заселении	5 – 10 дней	50
Откорм	5 – 10 дней	100

Sangrovit® WS не требует периода изъятия.
Предупреждение: продукт обладает низким уровнем pH, его не следует смешивать с вакцинами. Для разведения Sangrovit® WS используйте теплую воду.

SANGROVIT® WS ПРОСТ В ДОЗИРОВАНИИ И ДОСТУПЕН В УДОБНЫХ АЛЮМИНИЗИРОВАННЫХ МЕШКАХ ПО 1 КГ.

SANGROVIT® WS БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ФЕРМЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. НЕ ТРЕБУЕТ ПЕРИОДА ИЗЪЯТИЯ ПЕРЕД ЗАБОЕМ ИЛИ ПРОДАЖЕЙ ЯИЦ. ПО ДАННЫМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ SANGROVIT® WS СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ МЕДИКАМЕНТАМИ, КОРМАМИ И ДОБАВКАМИ. В СЛУЧАЕ ДЕСЯТИКРАТНОЙ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НИКАКИХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО. ЗАЯВЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНЫ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ОТ ФЕРМЫ К ФЕРМЕ.

ФИТОБИОТИКС

ООО «Фитобиотикс Рус»
Головинское ш., д.5,
БЦ «Водный», офис 13021
г. Москва, РФ, 125212
Тел.: +7 495 641 32 48
Факс: +7 495 641 32 49
E-mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.com